

**CASUÍSTICA DE PACIENTES FELINOS EN EL DEPARTAMENTO DE
MEDICINA VETERINARIA DE LA
FUNDACIÓN INSTITUTO COLOMBIANO DE HOMEOPATÍA “LUIS G. PÁEZ”,
ENTRE 1991 Y 2004**

**Dra. GISELA A. BAQUERO MORENO
MEDICA VETERINARIA
UNIVERSIDAD DE LA SALLE**

**Dra. MAGDA LUCY ROZO GOMEZ.
MEDICA VETERINARIA
UNIVERSIDAD DE LA SALLE**

**FUNDACIÓN INSTITUTO COLOMBIANO DE HOMEOPATÍA
“LUIS G. PÁEZ”
DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINARIA
BOGOTÁ, D.C.
2006**

**CASUÍSTICA DE PACIENTES FELINOS EN EL DEPARTAMENTO DE
MEDICINA VETERINARIA DE LA
FUNDACIÓN INSTITUTO COLOMBIANO DE HOMEOPATÍA “LUIS G. PAEZ”,
ENTRE 1991 Y 2004**

Dra. GISELA A. BAQUERO MORENO

Dra. MAGDA LUCY ROZO G.

**DIRECTORA: Dra. LUZ MARIELA RODRÍGUEZ
MÉDICA VETERINARIA HOMEÓPATA**

**FUNDACION INSTITUTO COLOMBIANO DE HOMEOPATÍA
“LUIS G. PÁEZ”
DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINARIA
BOGOTÁ, D.C.
2006**

DEDICATORIA

A Nestícor, que me mostró un mundo nuevo desde la Facultad, que me guió por el camino de las terapias alternativas y especialmente que con su ejemplo y enseñanza abrió una luz a mi vida con la homeopatía y la etología.

A Luz Mariela, mi profesora y mi amiga, que me enseñó en el aula y me sigue enseñando en el día a día la medicina homeopática.

Malú

A todas aquellas personas que de alguna manera tuvieron la valentía de creer en la homeopatía y compartieron sus enseñanzas y experiencias conmigo.

Gisela.

AGRADECIMIENTOS

A Dios,
a Mijito y a Lulú,
y a todos los gatos
que han sido mis compañeros de aventura
en la vida.

Malú

Agradezco a Malú por su amistad, colaboración y buena disposición en todo momento; a Luz Mariela Rodríguez por su valiosa asesoría y orientación; a Néstor Calderón por mantener nuestra motivación a flote y a Luis Fernando Vargas por su apoyo educativo.

Gisela.

CONTENIDO

	pag.
INTRODUCCION	9
1. MARCO TEORICO	10
2. METODOLOGÍA	16
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN	17
3.1. HISTORIAS	17
3.2. RAZAS	17
3.3. GENERO	18
3.4. EDAD	18
3.5. CASUÍSTICA	19
3.6. REMEDIOS	21
3.7. ENCUESTA	23
4. CONCLUSIONES	24
5. RECOMENDACIONES	25
BIBLIOGRAFIA	26
ANEXOS	28

LISTA DE FIGURAS

	pag.
Figura 1. Razas	17
Figura 2. Género	18
Figura 3. Edad	18
Figura 4. Casuística	19
Figura 5. Remedios	22

LISTA DE TABLAS

	pag.
Tabla 1. Casuística	19
Tabla 2. Remedios	21

LISTA DE ANEXOS

	pag.
ANEXO A. Formato de Encuesta a Médicos Veterinarios Alópatas y Homeópatas en Bogota D.C.	27
ANEXO B. Formato de Encuesta a Propietarios y Criadores de Gatos en Bogota D.C.	27

INTRODUCCION

En el mundo entero la casuística felina ha mostrado un incremento marcado para todos los países y para Colombia lo ha sido desde el año 1999 cuando un mayor número de personas adquieren gatos de criaderos y los que ya los tenían se preocupan más por ellos.

El gato al ser una especie animal con marcadas diferencias anatómicas y fisiológicas, por su particular psiquis y además por la sensibilidad a muchos compuestos químicos, permite que los médicos, y aún los propietarios, lo perciban con sensaciones combinadas de frustración y fascinación. Es uno de los pacientes favoritos para los homeópatas por cuanto ven en esa individualidad la posibilidad de aplicar los conceptos filosóficos, y como si fuera poco, es de las especies que responden rápida y exitosamente a ésta medicina.

Otra de las ventajas de la homeopatía en los gatos es la facilidad para la administración de los remedios, lo que no suele suceder con los fármacos alopáticos. Por ejemplo, con la presentación en gotas, los mininos las aceptan sin necesidad de entrar en franca lucha con ellos, además de contar con el recurso de la olfacción en el caso de animales muy agresivos.

Igualmente, en casos en los cuales solo hay muy pocos o a veces un único signo de enfermedad, un alópata necesitaría de más estudios, mientras que en homeopatía se repertorizaría para dar una solución al problema.

De la misma forma, hay enfermedades que presentan múltiples síntomas que a veces complican el cuadro clínico y no permiten ver con claridad que está pasando, por tanto, es muy útil para el homeópata repertorizar lo más peculiar de ese paciente obteniendo el medicamento indicado y por ende una franca mejoría.

Observando diferentes grupos de patologías felinas en Bogotá, tanto en clínicas que solo utilizan alopátia como las que manejan pacientes con alopátia y pacientes con homeopatía, se encuentra que hay enfermedades que ya sea por ser desconocidas por el médico veterinario o por no tenerse las ayudas diagnosticas adecuadas, se cree que no están presentes en el país. Sin embargo, hay también enfermedades que solo hasta hace pocos años (o meses incluso) han aparecido, como por ejemplo, enfermedades virales que se creen entraron a través de animales importados y/o que por cruzamientos se han ido perpetuando y es nuestro deber precisamente conocer que puede acontecer con ésta especie tan querida.

1. MARCO TEORICO

El creciente aumento de personas interesadas en los gatos, ha hecho que los médicos veterinarios vean incrementadas las consultas y esto no es diferente para los médicos veterinarios homeópatas.

Es una realidad que en el mundo desde hace muy poco tiempo, a diferencia de lo que sucede con otras especies, la medicina veterinaria consideró importante el estudiar los felinos ya que la enseñanza en la academia era muy pobre tanto en la parte clínica como de comportamiento.

Nuestro país no es ajeno a esta demanda de los felinos domésticos como mascotas. Esto se refleja en el último censo realizado en la ciudad de Bogotá, en donde por primera vez la Secretaria de Salud¹ se estableció que hay un total de 144.928 gatos que sirven como mascotas para las familias. La relación que hay de estos animales en comparación con la población, según la Secretaría, es de un gato por cada 48 personas.

Existen varios síndromes dentro de la clínica felina que son frecuentemente reportados por los propietarios como motivo de consulta entre los cuales se incluyen: vómito, diarrea, secreción nasal, tos, fiebre, poliuria/polidipsia, pérdida de peso. Por otro lado, algunos problemas pueden ser considerados como médicos cuando en realidad son trastornos de la conducta como por ejemplo micción inadecuada, el marcaje urinario, el acicalamiento excesivo². (Beaver y Overall, 1999).

El vómito es la eyección forzada del contenido que se encuentra en el estómago y duodeno proximal a través de la boca. Es un síntoma inespecífico de muchas enfermedades tanto digestivas (primarias) como extradigestivas (secundarias).

¹ CAICEDO, Felipe. Un censo canino reveló que en Bogotá hay un perro por cada diez personas. En: El Tiempo. Bogotá (Agosto 17, 2005).p. 1C, c. 1-3.

² BEAVER, Bonnie y OVERALL, Karol. Feline behavior guidelines from the American Association of Feline Practitioners In: Journal of the American Veterinary Medical Association. Vol. 227, No. 1 (July 1, 2005); p. 70.

Esta mediado por el centro del vómito y la zona gatillo quimiorreceptora. Las características del vómito incluyen la presencia de náuseas, contracción de los músculos abdominales, bilis, sangre digerida o alimentos.^{3,4} (Melendez, 2001; Crystal, 1998).

La gastroenteritis es un proceso inflamatorio del sistema gastrointestinal; en general se denomina de esta manera los cuadros donde se ve afectada el estómago y el intestino, cuando sólo está afectada una parte, se puede diferenciar entre: gastritis (inflamación del estómago), enteritis (inflamación del intestino), colitis (inflamación del colon) y proctitis (inflamación del recto). El término de gastroenteritis como tal, se caracteriza por la presencia de vómitos, diarreas, inflamación y dolor abdominal. Las causas que la producen son muy variadas, entre las cuales podemos mencionar las siguientes: alimenticias, parasitarias, bacterianas, virales, inflamaciones, tumores, cuerpos extraños, defectos congénitos, etc. Se ha considerado como una de los motivos de consulta mas frecuentes dentro de la práctica de la clínica felina.

La diarrea se caracteriza por un aumento o en la frecuencia o en el contenido líquido de las heces o en el volumen de la materia fecal. Hay cuatro tipos fisiopatológicos de diarrea: osmótica, secretoria, exudativa o por hipermotilidad. Puede ser clasificada como aguda o crónica, grave o no grave, de intestino delgado o de intestino grueso. Esta clasificación ayuda en la determinación de la causa específica de la diarrea permitiendo un mejor manejo del problema.⁵ (Melendez, 2001).

Los parásitos gastrointestinales se presentan más frecuentemente en gatos jóvenes. Los céstodos causan muy pocos o ningún síntoma clínico y los más frecuentemente encontrados son el *Dipylidium caninum* y la *Taenia sp.* El *D. caninum* se adquiere vía ingestión de pulgas infestadas y la Tenia a través de la ingestión de pequeños mamíferos infectados. No hay migración extraintestinal y tampoco se presentan infecciones transplacentarias o por la leche. Al contrario de lo que sucede con los céstodos, los nemátodos si presentan migración dentro del ciclo de vida a través de hígado y pulmón del huésped, como sucede con el *Toxocora cati* y los gaticos pueden infestarse por la leche.

³ CRYSTAL, Mitchell. The patient Feline. Baltimore: Ed. Williams & Wilkins, 1998. p. 93.

⁴ MELENDEZ, Linda. Gastrointestinal Problems In: Feline Internal Medicine Secrets. Philadelphia: Hanley & Belfus, 2001. p. 81

⁵ IBID. p.3

Los signos clínicos incluyen vómito y diarrea (a veces con la presencia de los parásitos), distensión abdominal y /o dolor, pérdida de peso o no ganancia (en bebés), tos y raramente obstrucción intestinal. ⁶ (Hoskins, 1999)

También es importante tener en cuenta la enfermedad intestinal inflamatoria idiopática felina dentro de los diagnósticos diferenciales dentro de la presentación de gastroenteritis en gatos, y es diagnóstico de exclusión de las causas mencionadas anteriormente para los signos de vomito y diarrea. Su signología es inespecífica como vómitos, diarrea, anorexia y pérdida de peso crónico e intermitente en gatos. En la patogénesis de la enfermedad inflamatoria intestinal pueden intervenir respuestas de hipersensibilidad del hospedador frente a antígenos lumenales y/o de la mucosa intestinal. No existen hallazgos hematológicos, bioquímicos o radiológicos que sean patognomónicos de este desorden. Para confirmar el diagnóstico es necesario realizar la biopsia de la mucosa intestinal. ⁷ (Crystal, 1998)

Las afecciones respiratorias en los felinos se presentan por lo general como síndromes de diversos orígenes, sin embargo no son fáciles de diferenciar con la simple guía de los signos clínicos. Entre las patologías mas comunes se nombran la bronquitis aguda, la bronquitis crónica, la bronquitis crónica asmática y el asma bronquial felina. Existen diversos agentes etiológicos como bacterias, hongos, alergenicos, pero la gran mayoría son originadas por virus y afectan en mayor proporción a gatos jóvenes que no hayan sido vacunados previamente.

Considerando el amplio espectro de la enfermedad respiratoria felina, la infección viral del tracto respiratorio superior es claramente la más prevalente y la más severa. Según Ford ⁸ : “la gran variedad de signos clínicos, la alta morbilidad y mortalidad en los gatos pequeños, la inconsistente respuesta a las terapias instauradas y la infección crónica en los gatos de todas las edades caracteriza los hallazgos clínicos de la enfermedad”. Se estima que en el 90% de los casos, está implicado uno de los dos grupos virales ya sea el herpes virus o el *Calicivirus* y

⁶ HOSKINS, Johnny. Pediatric Health Care and Management. In: The Veterinary Clinics of North America. Small Animal Practice. Philadelphia. W.B. Saunders Company. vol 29. no. 4. 1999. 26 p.

⁷ CRYSTAL, Mitchell; NORSWORTHY, Gary; FOOSHEE, Sharon; et. al. The Feline Patient: Essentials of Diagnosis and Treatment. Baltimore. Williams & Wilkins, 1998. 93 p.

⁸ FORD, R. B. Infectious Respiratory Disease. In: the Veterinary Clinics of North America. Small Animal Practice. W.B. Saunders Company. vol 14. no. 5. 1984.

Desde el año de 1944 la *Chlamydia psittaci* que ha sido reconocida como el tercer organismo involucrado, con al menos el 5% de todas las infecciones respiratorias del tracto superior felino.

Entre los problemas más consultados están las manifestaciones clínicas de hematuria, polaquiuria y disuria causadas por obstrucción de las vías urinarias inferiores ya sea por tapones mucoproteínicos, por urolitos, por neoplasias del cuello vesical o uretral entre las más comunes. Las últimas investigaciones han demostrado que estas enfermedades urinarias del tracto inferiores felinos están asociadas con factores inherentes a cada gato en particular, haciendo que los factores ambientales, como la dieta, se consideren menos relevantes⁹.

Dentro de las enfermedades infecciosas que muy seguramente fueron introducidas al país por gatos importados infectados y por un inadecuado manejo en los criaderos está la Leucemia Viral Felina (FeLV) considerada la causa más importante de muerte en los felinos. Es producida por un retrovirus y se han identificado tres subgrupos: el subgrupo A aislado en el 100% de los casos y es el precursor de los otros dos subgrupos (B y C). El A es el causante de los procesos infecciosos; se asocia a las formas inmunosupresoras que producen el 80% de las muertes. El subgrupo B se aísla en el 50% de los casos, origina tumores responsables del 20% de las muertes. El subgrupo C solo se aísla en el 1% de los casos y es capaz de infectar células troncales en particular de la serie eritroide, causando aplasia eritroblástica y anemia no regenerativa. La transmisión del virus es de forma horizontal, generalmente por inhalación o ingestión. Este virus no tiene predilección por raza ni sexo, y se presenta a cualquier edad, aunque es más frecuente en gatos jóvenes de uno a tres años.¹⁰ (Muñoz, L. 2001)

El Síndrome de Inmunodeficiencia Felina (FIV) es quizás una de las patologías menos diagnosticadas debido a la variedad de sintomatología y a la falta de pruebas de laboratorio económicamente accesibles al presupuesto de la mayoría de los propietarios. Es causado por un lentivirus y es más frecuente en machos (2 a 3 veces) que en las hembras y más en machos callejeros. El promedio de edad para la presentación de la enfermedad es de cinco a seis años.¹¹ (Muñoz, L. 2001)

⁹ BUFFINGTON, Tonny; WESTROPP, Massy; CHEW, et al. 2006. Risk factors associated with clinical signs of lower urinary tract disease in indoor-housed cats. *JAVMA* 228(5):722-725.

¹⁰ MUÑOZ, Luis. Enfermedades virales felinas. Parte II. Tecnovet, año 7, Nº 2, agosto 2001.

¹¹ IBID. p.

La Peritonitis Infecciosa Felina (FIP) es una enfermedad inmunomediada producida por un coronavirus felino. Existen dos coronavirus felinos FIPV y FECV. Ambos son el mismo virus desde el punto de vista antigénico y genético; sin embargo, uno de ellos desarrolla una enfermedad mortal (FIVP) y el otro solo una leve enteritis. Descubierta desde la década de los 70's todavía supone hoy en día, una fuente de problemas en cuanto a su origen, incidencia, epidemiología, diagnóstico, prevención y tratamiento. Es una enfermedad de baja morbilidad pero alta mortalidad. Se disemina por ingestión o inhalación.¹² (García, J.R.; Ynajara, E 1998)

Las dermatofitosis son muy comunes en los criaderos y refugios, siendo el *Microsporium canis* el agente más comúnmente aislado y el que más problemas de zoonosis presenta. Por lo tanto, es muy importante una buena relación entre los criadores y los médicos veterinarios para instaurar unas buenas medidas profilácticas y para explicarle al nuevo dueño de la mascota que ésta es una enfermedad tratable y curable.¹³ (August, 1993)

Los gatos de todas las razas pueden tener predisposición a padecer gingivitis y enfermedad periodontal. El progreso de la enfermedad provoca retracción gingival con exposición de raíces y bifurcaciones donde se acumulan cantidades significativas de placa bacteriana, formándose cálculos, sacos o bolsas periodontales, así como movilidad y pérdida final de los dientes. Los gatos con lesiones resorptivas odontoclásticas a menudo se presentan con signos de inapetencia, reticencia a comer comidas secas, comportamiento depresivo y dolor oral.¹⁴ (August J.R).

La creciente popularidad de los gatos incrementa el impacto de los problemas de conducta y cada vez más y más gatos son realojados o sacrificados. Las mascotas son, a veces, rechazadas por conductas que son absolutamente

¹² GARCÍA, Jose Ramon y YNARAJA, Enrique. Problemática actual de la peritonitis infecciosa felina (FIP). Ciencias Veterinarias. [base de datos en línea], Madrid, España. Diciembre, 1998, no. 198 <http://www.colvet.es/infovet/dic98/ciencias_v/articulo2.htm>

¹³ AUGUST, Jhon. Consultations in Feline Internal Medicine. Quinta ed. St. Louis. Intermédica 1993. 291p.

¹⁴ AUGUST, Johnny. Enfermedad Gingival Felina. Revista electrónica de Veterinaria REDVET [base de datos en línea], Abril 2003, vol. 4, no. 4. <<http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n040403.html>> ISSN 16957504

normales para su especie como por ejemplo la necesidad de los gatos de afilarse las uñas y marcar el territorio con orina, Sin embargo son estas conductas además de la agresión los motivos de consulta más frecuentes en la práctica privada.¹⁵ (Heath, S.; 2002). Se considera que la micción inapropiada es el problema de comportamiento más común y que aproximadamente el 10% de todas las mascotas felinas en algún momento de su vida pueden ser llevadas al veterinario por este motivo ¹⁶ (Carney, H. 2001).

Por último es importante no dejar de lado los problemas endocrinos dentro de los cuales el hipertiroidismo es un desorden común en gatos adultos. La mayoría de los casos se deben a adenomas o hiperplasias adenomatosas funcionales de la glándula. El diagnóstico se realiza demostrando niveles altos de las hormonas tiroideas (tirotoxicosis). ¹⁷ (Rubio, Alicia, 2000)

¹⁵ HEATH, Sarah. Prevención de los problemas de comportamiento en perros y gatos. En: Jevring. C.; Catanzaro T. Cuidados de salud para el bienestar de perros y gatos. Ediciones Harcourt S.A.; Madrid, 2002. p.45.

¹⁶ CARNEY, H. C. Inappropriate urination. In: Lappin, M. R. Feline Internal Medicine Secrets. Hanley & Belfus, INC. 2001.

¹⁷ RUBIO, Alicia: Tratamiento Para Gatos Con Hipertiroidismo. AAMeFe - Asociación Argentina de Medicina Felina : [base de datos en línea], Lima, Peru; julio 2000, <<http://www.aamefe.org/hipertiroidismo.html>

2. METODOLOGIA

Se revisaron las historias clínicas de los pacientes felinos del Departamento de Veterinaria del Instituto entre los años 1.991 y 2.004, durante cuatro horas diarias tres veces a la semana durante 12 semanas. Posteriormente, se anotaron los motivos de consulta y los medicamentos prescritos.

Debido a que en Colombia no se conocen estadísticas acerca de las enfermedades más comunes en los gatos, se realizó una entrevista con 20 directores de clínicas y consultorios de pequeños animales de reconocida trayectoria y de diferentes zonas de la ciudad; entre ellos se contó con dos especialistas dedicados en un 90% a la medicina felina.

También se les preguntó a varios dueños de establecimientos dedicados a la cría y venta de gatos (cuatro) y a varios médicos veterinarios tanto alópatas (24) como homeópatas (seis) que trabajan en clínica de pequeños animales, para conocer sus opiniones acerca del conocimiento que tenían de las diferentes razas felinas, de su comportamiento, de las patologías frecuentes y desde que fecha consideraban que se había incrementado el número de pacientes felinos. (Anexo 1 y Anexo 2)

Posteriormente se clasificaron los síntomas o enfermedades reportados como motivo de consulta por sistemas, se anotaron las razas, edades, sexo, los remedios prescritos y se tabularon los datos obtenidos.

3. RESULTADOS Y DISCUSION


3.1. HISTORIAS

Se revisó un total de 134 historias clínicas únicamente de gatos entre 1.991 y 2.004 en la sede del Departamento de veterinaria del Instituto.

3.2. RAZAS

Fueron reportados 79 Criollos, 23 desconocida, 13 Siamés, 12 Persas, 5 Angoras, y 2 Ruso azul.


Figura 1. Porcentaje de Razas



3.3. GENERO

Dentro de las 134 historias se encontró que fueron atendidos 69 machos y 65 hembras.

Figura 2. Distribución por Género




3.4. EDAD

Para facilitar la tabulación, los felinos atendidos se clasificaron en cuatro grupos:

- 🐾 cachorros (entre 1 día a 12 meses): 51
- 🐾 adultos (entre 1 a 7 años): 54
- 🐾 adultos mayores - senior - (7 años en adelante): 16
- 🐾 edad desconocida: 13.

Figura 3. Distribución por edad



3.5. CASUÍSTICA


Hay que tener en cuenta que algunos pacientes no venían por enfermedad sino a un chequeo general, a vacunación o por problemas de comportamiento.

Aunque el médico veterinario homeópata ve al paciente de una forma holística, para efectos didácticos del trabajo se clasificaron las patologías por sistemas según los motivos de consulta reportados en las historias clínicas.

Tabla 1. Casuística

SISTEMAS	SÍNTOMAS	PACIENTES
Digestivo	Vómito	13
	Diarrea	11
	Parasitismo	11
	Prolapso rectal	1
	Tenesmo fecal	1
	Enfermedad periodontal	4
	Halitosis	2
Piel	Dermatitis por pulgas	4
	Sarna	1
	Peladuras	6
	Abscesos	2
Nervioso	Dolor	4
	Pérdida de la propiocepción	1
	Síndrome de Rolling skin	1
	Convulsiones	1
Reproductivo	Aborto	1
	Preñez	1
	Infecciones	4
Músculo esquelético	Cojeras	6
Urinario		2
Neoplasias		7
Chequeo general		22
Vacunación		7
Problemas de comportamiento	Marcaje urinario	8
	Agresividad	6
Respiratorio	Tos	6
	Estornudo	9
	Asma	1
Pérdida de peso		4

Figura 4. Casuística



De acuerdo con los resultados las tres manifestaciones patológicas que presentan un porcentaje mayor de presentación en el Instituto para estos años son:

- ☛ Vómito con un 11%,
- ☛ Diarrea con un 9%,
- ☛ Parasitismo con un 9%.


3.6 REMEDIOS

Los remedios más utilizados para estas manifestaciones patológicas son:

Tabla 2. Remedios

SÍNTOMA	REMEDIO	NUMERO DE PACIENTES
Vómito	Calc 30	Dos
	Cal 200	Uno
	Phos 0/6	Uno
	Sulph 30	Tres
	Nux-v 30	Dos
	Nux-v 0/6	Uno
	Lyc 10 M	Uno
	Puls 0/6	Dos
	Sil 30	Uno
	Desconocido	Uno
Diarrea	Phos 0/6	Dos
	Sulph 0/6	Uno
	Sulph 30	Dos
	Ars 30	Uno
	Lyc 10 M	Uno
	Calc 30	Uno
	Merc 30	Uno
	Lach 0/6	Uno
	Sil 30	Uno
	Desconocido	Uno
Parasitismo	Sulph 30	Uno
Gastrointestinal	Suloh 200	Uno
	Puls 200	Dos
	Calc 30	Dos
	Calc 200	Cuatro
	Cook 5	Uno
	Graph 200	Uno
	Cina 30	Uno

Figura 5. Remedios



3.7. ENCUESTA

De acuerdo con los resultados de las encuestas verbales se determinó:

- ☛ Que los criadores, que por cierto no son médicos veterinarios, conocen mucho sobre razas, comportamiento y de forma muy general sobre las enfermedades.
- ☛ Por el contrario los médicos veterinarios tanto alópatas como homeópatas en general saben de las enfermedades pero desconocen de las razas, no saben mucho acerca del comportamiento normal de los gatos, ni les enseñan a sus clientes que es normal y que es patológico.
- ☛ El consenso general entre criadores y médicos veterinarios tanto alópatas como homeópatas es que el auge hacia la tenencia de los gatos empezó en el año 2000.
- ☛ Dentro de las enfermedades que más observan están la peritonitis infecciosa felina, la leucemia viral felina, el síndrome de inmunodeficiencia felina y las diversas enfermedades respiratorias como la rinotraqueitis y el calicivirus en los pacientes de los veterinarios que trabajan en el norte de la ciudad. Para los veterinarios que laboran en el sur las patologías mas frecuentes son las respiratorias, las enfermedades del tracto urinario bajo, los traumatismos por accidente y el parasitismo gastrointestinal.

4. CONCLUSIONES

De acuerdo con los resultados obtenidos se observó que fue el vómito, como único síntoma o como parte de un proceso patológico, el motivo por el que más se consultó en el Departamento de Veterinaria del Instituto, entre 1.988 y 2.004, seguido de diarrea y de parasitismo gastrointestinal.

Debido a que en muchas de las historias clínicas no se anexó la repertorización, fue imposible saber que síntomas se tomaron en cuenta para la prescripción de los remedios. Además, es notoria la deficiencia en la consignación escrita de la toma de caso.

De igual manera se encontró que en términos generales el medicamento más prescrito para gatos en el Instituto para todas las patologías es la Calcárea carbónica y que la potencia mas empleada es la 30 centesimal.

Los alópatas en general tienen en común como uno de los tres principales síntomas la diarrea y el vómito como manifestaciones de la peritonitis infecciosa felina e igualmente del parasitismo gastrointestinal.

Es muy importante no solo para el gremio homeopático sino para todos los veterinarios dedicados a la medicina felina, conocer acerca de las razas, del comportamiento normal y de las enfermedades de esta especie para poder dar una buena orientación a los propietarios.

5. RECOMENDACIONES

Se debe conocer muy bien la especie con la cual se está trabajando, en éste caso la felina, para saber que es patológico, que es normal, cuales son sus necesidades, y de ésta forma, poderle explicar al dueño que comportamiento puede corregirse y cual no.

Debido a la falencia que los médicos veterinarios presentan acerca de la zootecnia felina, la información ha venido siendo manejada por los criadores y vendedores de mascotas quienes no deberían ser los transmisores adecuados de estos conocimientos hacia los propietarios de gatos.

Es muy importante consignar el mayor número de datos lo más exacto posible en la historia clínica para que el médico veterinario de turno pueda tener una mejor comprensión del caso.

Seria muy importante no solo para el departamento sino para la comunidad veterinaria, hacer una aproximación al diagnóstico nosológico ya que esto permitira a futuro conocer la situación real de las enfermedades en el país y poder presentar buenos casos clínicos en los congresos.

Es deber del homeópata colocar el diagnóstico nosológico y cual o cuales fueron los criterios que usó para repertorizar al paciente.

Recordar siempre que las ayudas diagnósticas no son excluyentes en la homeopatía veterinaria.

Al encuestar a los colegas homeópatas se observó que están de acuerdo que el gato es una de las especies para la que es más fácil, rápida, suave y segura la Homeopatía, que responden muy rápida y eficazmente a los tratamientos sobre todo comparados con los tratamientos alopáticos.

Observando la rapidez y seguridad conque evolucionaron los pacientes felinos después de los tratamientos homeopáticos y teniendo en cuenta su sensibilidad a muchos productos farmacológicos, se debe hacer un mayor énfasis dentro del gremio veterinario para la difusión y empleo de la homeopatía como primera alternativa en las diferentes patologías que manifiestan los gatos.

BIBLIOGRAFIA

AUGUST, Jhon. Consultations in Feline Internal Medicine. Quinta ed. St. Louis. Intermédica, 1993. 291p.

AUGUST, Johnny. Enfermedad Gingival Felina. Revista electrónica de Veterinaria REDVET [base de datos en línea], Abril 2003, vol. 4, no. 4. <<http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n040403.html>> ISSN 16957504

BEAVER, Bonnie y OVERALL, Karol. Feline behavior guidelines from the American Association of Feline Practitioners In: Journal of the American Veterinary Medical Association. Vol. 227, No. 1 (july 1, 2005); p. 70.

CARNEY, H. C. Inappropriate urination. In: Lappin, M. R. Feline Internal Medicine Secrets. Hanley & Belfus, INC. 2001.

CAICEDO, Felipe. Un censo canino reveló que en Bogotá hay un perro por cada diez personas En : El Tiempo. Bogotá (Agosto 17, 2005).p. 1C, c. 1-3.

CRYSTAL, Mitchell; NORSWORTHY, Gary; FOOSHEE, Sharon; et. al. The Feline Patient:. Essentials of Diagnosis and Treatment. Baltimore. Williams & Wilkins, 1998. 93 p.

Conversaciones con directores de clínicas veterinarias alópatas y homeópatas. Criadores y expositores de gatos. Bogotá, entre Enero y Abril, 2006.

FORD, R. B. Infectious Respiratory Disease. In: the Veterinary Clinics of North America. Small Animal Practice. W.B. Saunders Company. vol 14. no. 5. 1984.

GARCÍA, Jose Ramon y YNARAJA, Enrique. Problemática actual de la peritonitis infecciosa felina (FIP). Ciencias Veterinarias. [base de datos en línea], Madrid, España. Diciembre, 1998, no. 198 <http://www.colvet.es/infovet/dic98/ciencias_v/articulo2.htm>

GRANT, D.I : Enfermedades de la piel en perros y gatos. 2ª ed. México D.F. : McGraw-Hill. Interamericana. 1.996. 2001 p.

HANNEMAN, Samuel. Órganon de la medicina. 6ª ed.: México D.F Editorial Porrúa. 1999. 341 p.

HEATH, S. Prevención de los problemas de comportamiento en perros y gatos. In: Jevring. C.; Catanzaro T. En: Cuidados de salud para el bienestar de perros y gatos. Ediciones Harcourt S.A.; Madrid, 2002. p.45.

Historias Clínicas del Departamento de Medicina Veterinaria de la Fundación Instituto Colombiano de Homeopatía "Luís G. Páez". 1991 a 2004.

HOSKINS, Johnny. Pediatría Veterinaria. México. Interamericana. McGraw –Hill. 1.993. 97 p.

HOSKINS, Johnny. Pediatric Health Care and Management. In: The Veterinary Clinics of North America. Small Animal Practice. Philadelphia. W.B. Saunders Company. vol 29. no. 4. 1999. 26 p.

MELENDEZ, Linda. Gastrointestinal Problems. In: LAPPIN, Michael. Feline Internal Medicine Secrets. Philadelphia. Hanley & Belfus, 2001. 81 p.

MUÑOZ, L. Enfermedades virales felinas. Parte II. Tecnovet, año 7, N° 2, agosto 2001.

RUBIO, Alicia: Tratamiento Para Gatos Con Hipertiroidismo. AAMeFe - Asociación Argentina de Medicina Felina : [base de datos en línea], Lima, Peru, julio 2000, <<http://www.aamefe.org/hipertiroidismo.html> >

SÁNCHEZ. Rodrigo. Enfermedad periodontal en animales pequeños En: Odontología Veterinaria. Manizales. Imprenta departamental de Caldas. 1993. 175 p.

ANEXOS

ANEXO A. Formato De Encuesta A Médicos Veterinarios Alópatas Y Homeópatas En Bogotá, D. C.

1. Desde que año considera se ha aumentado el numero de pacientes felinos en su practica clínica?
2. Cuales son las tres enfermedades mas frecuentes que actualmente se presentan en su clínica ?
3. Que porcentaje de pacientes consultan por problemas de comportamiento o por conductas inadecuadas para el dueño. Sabe ud. diferenciarlas?. Sabe el propietario diferenciarlas?. Le explica las diferencias al dueño?.
4. Conoce ud. de razas felinas?.

ANEXO B. Formato De Encuesta A Propietarios Y Criadores De Gatos En Bogota, D.C.

1. Sabe de que raza es su mascota?.
2. Conoce de razas de gatos?.
3. Sabe diferenciar un problema de comportamiento de una conducta inapropiada?. Su médico veterinario le ha explicado la diferencia?.
4. Por qué llevado a su gato al veterinario?.